

【消化】

- (C) 1. 上腸胃道黏膜之完整性被認為是一種潰瘍形成的防禦機轉，下列因子與黏膜完整性均有關係，除了：
- A. 黏液(Mucus).
 - B. 重碳酸鹽(Bicarbonate).
 - C. Cholinergic nerve 完整性.
 - D. 粘膜層供血量(Mucosal blood flow).
 - E. 細胞再生能力(Cell renewal).
- (C) 2. 有關胰臟之內分泌腺腫瘤(endocrine tumors)，下列何者錯誤？
- A. 胰臟內分泌腺腫瘤中最常見者為 Gastrinoma.
 - B. Zollinger-Ellison 症候群之臨床表現包括血清 gastrin 值升高，腹瀉及消化性潰瘍(Peptic ulcer).
 - C. Watery diarrhea hypokalemia achlorhydria (WDHA) 症候群是因為腫瘤分泌過多 glucagon 造成.
 - D. 大多數內分泌腺腫瘤為惡性，且易於在診斷前轉移出去.
 - E. Octreotide 可以抑制內分泌腺腫瘤引起之腹瀉.
- (B) 3. 關於大腸良性息肉(polyp) 的敘述，下列那一項「不」正確？
- A. 不到百分之五的腺瘤性息肉(adenomatous polyp)可能導致糞便潛血反應.
 - B. 第 17 對染色體長臂上的 P53 基因與腺瘤性息肉和腺癌的產生有關.
 - C. 廣基性(sessile) 息肉較有蒂性(pedunculated)息肉容易轉化為癌症.
 - D. 大腸某一部位被發現有腺瘤性息肉，則約三分之一的病例可在其他部位找到相同的病變.
 - E. 幼年型息肉症(juvenile polyposis)癌化的可能性甚小.
- (C) 4. Zollinger-Ellison 症候群之病人，臨床上常有下列那一種情況出現？
- A. 血清胃泌激素(gastrin)在所有的病例皆大於 1000 pg/ml.

- B. 胃泌激素瘤(gastrinoma)最常發生在胰臟之頭部.
- C. 約有 40% 之病例會出現腹瀉下痢.
- D. 目前最佳之外科治療方式為次全胃切除術.
- E. 約 75% 之病人在十二指腸第二部份會出現不易治療之潰瘍.

(D) 5. 下列有關急性食道靜脈曲張出血的敘述何者為非？

- A. 食道靜脈曲張越厲害越容易出血.
- B. 上消化道內視鏡檢查乃診斷食道靜脈曲張出血的最好方法.
- C. 大約有一半的病人可自動止血，但再出血率很高.
- D. Propranolol (Inderal) 可有效地控制急性食道靜脈曲張出血.
- E. 經內視鏡食道硬化治療可控制大部份的出血.

(A) 6. 何謂 Caroli's disease？

- A. 先天性肝內膽管囊狀擴張.
- B. 肝內膽管阻塞之統稱.
- C. 先天性總膽管擴張.
- D. 胰管因總膽管結石阻塞引致擴張.
- E. 因膽道結石反覆發作導致肝硬化.

(D) 7. 下列有關原發性膽汁性肝硬化(Primary biliary cirrhosis)之敘述何者為非？

- A. 患者大多為中年女性.
- B. 患者常有皮膚癢之症狀.
- C. 大於 95% 之患者血清中 anti-mitochondrial antibody 呈陽性.
- D. 血清中 IgM 通常不會增高.
- E. 肝內小膽管增生為病理學變化之第二期.

(D) 8. 治療消化性潰瘍，下列藥物何者不以抑制胃酸分泌或中和胃酸作為主要治療機轉？

- A. Cimetidine.
- B. Aluminum-Magnesium Hydroxide.
- C. Omeprazole.
- D. Sucralfate.
- E. Nizatidine.

- (D) 9. 下列有關胃平滑肌肉瘤(leiomyosarcoma)之描述，何者是不正確者？
- A. 約佔胃部惡性腫瘤之 1-3%.
 - B. 腫瘤常呈球狀，大，而位於胃之上半部.
 - C. 常出現貧血，三分之一病例有大量出血.
 - D. 腫瘤常有淋巴結轉移，罕有肝臟及腹腔轉移.
 - E. 放射線治療效果不佳.
- (C) 10. 有關末期肝硬化併發的肝腎症候群(hepatorenal syndrome)，下列那一敘述「不」正確？
- A. 腎臟本身並無明顯的病理變化.
 - B. 與導致腎血管收縮的許多因素有關.
 - C. 病人尿中的鈉含量極高.
 - D. 病人尿液滲透壓較血漿滲透壓為高.
 - E. 預後甚差.
- (E) 11. 下列何者是可以引起便秘(constipation)之原因？
- A. 治療帕金森氏病之藥物.
 - B. 帕金森氏病(Parkinson's disease).
 - C. 纖維質缺乏之飲食.
 - D. 甲狀腺功能過低.
 - E. 以上皆是.
- (E) 12. 有關缺血性大腸炎(ischemic colitis)的敘述，下列何者「不」正確？
- A. 較常見於年紀大者.
 - B. 左側大腸較右側大腸常見.
 - C. 雖侵犯左側大腸，但直腸部分常能倖免.
 - D. 非阻塞性病變遠較阻塞性常見.
 - E. 血管攝影檢查通常有助提供有效的治療.
- (B) 13. 有關過量服用 acetaminophen 所導致的肝臟傷害，下列那一敘述「不」正確？
- A. 血中濃度的高低和肝臟傷害程度有關.
 - B. 服用後 4 小時，血中濃度若高於 100 ug/ml，則無可避免會導致嚴重肝傷害.
 - C. 肝傷害與毒性代謝產物有關.

- D. 一次服用 10 公克即可能造致肝傷害，但慢性酗酒者其量可能低至 2 公克。
- E. 復原者通常不會有肝病的後遺症。

(A) 14. 有關賁門失弛症(achalasia)，下列那一敘述「不」正確？

- A. 女性遠較男性為多。
- B. 主要病因為食道下端括約肌神經支配有缺損情形。
- C. 主要症狀包括吞嚥困難、胸痛和食物反流等。
- D. 胸部 X 光有時可在縱膈腔見到氣液平面(air-fluid level)，為具特徵性的變化。
- E. 對食道下端括約肌做氣球擴張術或粘膜外肌肉切開術，都是有效的治療方法。

(A) 15. 有關十二指腸潰瘍之敘述，以下何者為正確？

- a. 在台灣，最常見之消化性潰瘍為十二指腸潰瘍。
 - b. *Helicobacter Pylori* 之陽性率為 80-100%。
 - c. 臨床症狀上一定會有上腹餓痛或半夜上腹痛之經驗。
 - d. 抽煙者，潰瘍之再發率高。
- A. a+b+d.
 - B. a+b+c.
 - C. a+b.
 - D. a+c+d.
 - E. c+d.

(B) 16. 有關十二指腸潰瘍的病因和病理發生，下列那一敘述「不」正確？

- A. 十二指腸潰瘍病人的平均胃酸分泌量較非潰瘍者為高，但實際上多數十二指腸潰瘍病人的胃酸分泌量仍在正常範圍內。
- B. 十二指腸潰瘍病人的空腹血中胃泌素(gastrin) 濃度通常較常人為高。
- C. 十二指腸潰瘍病人約有半數，其血中第一型胃蛋白原(pepsinogen I) 的濃度升高。
- D. 十二指腸潰瘍病人超過百分之八十，其胃部受到幽門螺旋菌(*Helicobacter pylori*) 感染。
- E. 十二指腸潰瘍病人的胃排空有較非潰瘍者為快的傾向。

- (E) 17. 有關上消化道出血之敘述，何者為正確？
- a. 柏油便之發生至少應有 80-100 ml 之出血，且可持續 3-7 天.
 - b. BUN 會上昇，但較少超過 50 mg/dl.
 - c. 出血中亦可施行上消化道內視鏡檢查.
 - d. Occult blood (糞便內) 陽性，並不表示正在出血.
- A. a+b.
B. b+c.
C. a+b+d.
D. a+c.
E. a-d 全正確.
- (B) 18. 有關大腸癌之敘述，以下何者為錯誤？
- A. 貧血易見於右側大腸癌.
 - B. Dukes' 分類中，Dukes' A 五年之存活率為 30~60%.
 - C. 大便習慣之改變多見於左側大腸癌.
 - D. Dukes' 分類中 Dukes' B 表示浸潤主肌層或漿膜層，但無淋巴腺之侵犯.
 - E. 大腸癌和大腸內之 Adenoma 有關.
- (E) 19. 肝腎症候群 (Hepatorenal syndrome) 的實驗室檢查，何者為非？
- A. Urine sodium < 10 mEq/L.
 - B. Urine: plasma creatinine ratio > 30:1.
 - C. Urine: plasma osmolality ratio > 1.0.
 - D. Normal urine sediment, no proteinuria.
 - E. Urine sodium > 30 mEq/L.
- (A) 20. 干擾素可用於治療病毒性肝炎，下列何者例外？
- A. A 型肝炎.
 - B. B 型肝炎.
 - C. C 型肝炎.
 - D. D 型肝炎.
 - E. B 型 + D 型肝炎.
- (C) 21. 下列何者血清學標記在某些特定情況下可用來區別急性與慢性的 B 型肝炎病毒感染？
- A. HBeAg.

- B.HBV DNA.
- C.IgM anti-HBc.
- D.IgG Anti-HBc.
- E.Anti-HBs.

(B) 22.病毒性肝炎 A, B, C, D, E 五種當中, 何者是 DNA 病毒?

- A.Hepatitis A virus.
- B.Hepatitis B virus.
- C.Hepatitis C virus.
- D.Hepatitis D virus.
- E.Hepatitis E virus.

(D) 23.下列何種遺傳性消化道息肉症候群之息肉最不具惡性傾向 (Malignant potential)?

- A.Familial colonic polyposis.
- B.Gardner's syndrome.
- C.Turcot's syndrome.
- D.Peutz-Jeghers syndrome.
- E.以上皆非.

(D) 24.某 30 歲男性, 肝炎標記檢查顯示 HBsAg(-), Anti-HBs(+), 及 IgG Anti-HBc(-), 下列何者為最適當的診斷?

- A.急性乙型肝炎.
- B.慢性乙型肝炎合併急性發作.
- C.低濃度乙型肝炎表面抗原(HBsAg) 的帶原者.
- D.Anti-HBs 為假陽性或曾接受乙型肝炎疫苗注射.
- E.乙型肝炎的一種亞型感染.

(A) 25.潰瘍性結腸炎(Ulcerative colitis)易併發結腸腫瘤, 但有些因子是高危險性因子, 關於兩者關連之敘述, 何者為誤?

- A.同時合併結腸外症候 (extracolonic manifestations)
- B.結腸受炎症侵犯超過十年者, 機率升高.
- C.結腸受炎症侵犯程度嚴重者, 機率升高.
- D.患此疾十年以上須定期篩檢(surveillance).
- E.出現分化不良(dysplasia) 更應縮短篩檢期.

- (E) 26. 在我國，下列何者不為肝移植的適應症？
- A. Primary biliary cirrhosis.
 - B. Budd-Chiari Syndrome.
 - C. Biliary atresia.
 - D. Sclerosing cholangitis.
 - E. Hepatocellular carcinoma.
- (A) 27. 鹼性磷酸 (Alkaline phosphatase) 在下列那種情況絕對不會上升？
- A. 蝕骨性骨疾病(Osteoclastic bone disease).
 - B. 懷孕末期.
 - C. 膽道阻塞(Biliary tract obstruction).
 - D. 肝細胞癌(Hepatocellular carcinoma).
 - E. 轉移性肝腫瘤(Metastatic liver tumor).
- (E) 28. 關於大腸直腸癌，我們常用 Dukes' classification 來分期，藉以評估其預後，試問 Dukes' B 病人的五年存活率為何？
- A. < 30 %.
 - B. 30 - 50 %.
 - C. 50 - 60 %.
 - D. 60 - 70 %.
 - E. 70 - 85 %.
- (B) 29. 下列有關遺傳性大腸息肉症(Hereditary colon polyposis) 之敘述何者為非？
- A. 家族性大腸多發息肉症(Familial colonic polyposis) 為正染色體的(autosomal)顯性遺傳.
 - B. Gardner 症候群(Gardner's syndrome)為正染色體的隱性遺傳.
 - C. 家族性大腸多發息肉症之息肉為腺瘤性息肉(Adenomatous polyp).
 - D. Gardner 症候群之息肉為腺瘤性息肉.
 - E. Peutz-Jeghers 症候群(Peutz-Jeghers syndrome)之息肉為過誤瘤(hamartoma).
- (E) 30. 下列有關 Acetaminophen 中毒的描述，何者是錯的？
- A. 當劑量超過 140 mg/kg 時極易導致肝臟毒性.

- B. Acetaminophen 中毒時，肝臟的酵素如 AST、ALT 通常在中毒後 48 小時開始上升，而在 72 至 96 小時的時候達到頂點。
- C. 嗜酒病人較一般人容易發生 Acetaminophen 引致之肝臟毒性。
- D. Acetaminophen 中毒時所造成肝臟毒性是因為中間代謝物 N-acetyl-p-benzoquinonimine 的累積所致。
- E. Acetaminophen 中毒必須在 8 小時內給予 acetylcysteine 以預防肝臟毒性，若超過 8 小時給藥便完全沒有功效。

(A) 31. 高傳染性的 B 型肝炎帶原者為？

- A. HBsAg(+), HBeAg(+), Anti-HBe(-).
- B. HBsAg(+), HBeAg(-), Anti-HBe(+).
- C. HBsAg(+), HBeAg(-), Anti-HBe(-).
- D. HBsAg(-), Anti-HBs(-), HBV DNA(+).
- E. HBsAg(-), Anti-HBs(+).

(C) 32. 下列那種食道癌最為常見？

- A. Adenocarcinoma.
- B. Sarcoma.
- C. Squamous cell carcinoma.
- D. Small cell carcinoma.
- E. Large cell carcinoma.

(E) 33. 酒精性肝病患者之實驗室檢查可能出現那些特徵？

- A. ALT/AST 比值超過 2.0.
- B. 紅血球之 MCV 增加.
- C. γ -GT 升高.
- D. 以上皆是.
- E. 2 + 3.

(E) 34. 一位病人有慢性 B 型肝炎，血清 HBeAg 陽性，最近突然出現右上腹痛及黃疸，其血清生化學檢查結果如下：
GOT: 185(<31), GPT: 194(<31), A/G: 4.0/3.5,
Bilirubin(total/direct): 8.5/5.5 (<1.0/0.4), ALP(Alkaline phosphatase): 530(<238), γ -GT: 287(<70),
請問其最可能之診斷為下列何者？

- A. 慢性小葉性肝炎.
- B. 慢性活動性肝炎併有酒精性肝病.
- C. 慢性 B 型肝炎併有酒精性肝炎.
- D. 失代償性肝硬化(Decompensated liver cirrhosis).
- E. 總膽管結石阻塞而造成阻塞性黃疸.

(D) 35. 下列何種藥物可以造成肝臟傷害？

- A. Isoniazid.
- B. Methotrexate.
- C. Methyl dopa.
- D. 以上皆是.
- E. 1+2.

(E) 36. 有關急性 C 型肝炎，下列那一敘述「不」正確？

- A. 是目前輸血後肝炎的主因.
- B. 是一種 RNA 病毒與黃熱病病毒屬於同一科(family).
- C. 約一半病例為散發性(sporadic)，感染途徑不明.
- D. 發病潛伏期較急性 A 型肝炎為長.
- E. 轉變為慢性肝炎的頻率與急性 B 型肝炎大致相同.

(B) 37. 消化性潰瘍之併發症當中，以何者之發生率為最高？

- A. 穿孔.
- B. 出血.
- C. 阻塞.
- D. 癌變.
- E. 頑強性疼痛.

(C) 38. 有關胃癌之敘述，以下何者為錯誤？

- A. 在日本之發生率最高，其次為中國、智利、冰島.
- B. 胃癌約 90% 為 Adenocarcinoma.
- C. 血型為 O 型者，比 A 型更易得胃癌.
- D. 找不到原因之缺鐵性貧血，並且糞便潛血反應陽性應考慮胃腸道腫瘤之可能性.
- E. Nitrites 為引起胃癌之可能原因之一.

(B) 39. 下列有關肝性腦病變(Hepatic encephalopathy)的敘述，何者為誤？

- A. 假性神經傳導物質(False neurotransmitter)如

Octopamine 也扮演一個角色.

- B. 神智不清的程度與 GABA 濃度的降低也有一定的關係.
- C. 氨的濃度升高是肝性腦病變的致病機轉之一.
- D. 當肝性腦病變恢復通常伴隨著氨濃度的降低.
- E. 其他物質如 Mercaptans, short-chain fatty acid, phenol 與肝性腦病變亦有關係.

- (C) 40. 下列有關壓力性潰瘍(stress ulcer)的敘述何者為非？
- A. 壓力性潰瘍常併發於休克、燒傷、敗血症及嚴重創傷等重症.
 - B. 胃的壓力性潰瘍常發生在分泌胃酸的部份，而且常是多發性的.
 - C. 壓力性潰瘍並不會在十二指腸部份產生.
 - D. 壓力性潰瘍治療的重要原則是預防重於治療.
 - E. 上消化道內視鏡是診斷壓力性潰瘍最重要的工具.
- (B) 41. 下列那種疾病不會引起直接型高膽紅素血症(Direct hyperbilirubinemia)？
- A. Dubin-Johnson's syndrome.
 - B. Gilbert's syndrome.
 - C. 慢性肝炎(Chronic hepatitis).
 - D. 膽道阻塞(Biliary tract obstruction).
 - E. Rotor's syndrome.
- (C) 42. 一位病人因解瀝青便(tarry stool)住院，當病人有血容不足(hypovolemia)時，下列何者最早出現？
- A. 血色素降低.
 - B. 尿量減少(oliguria).
 - C. 心跳加速(tachycardia).
 - D. 休克.
 - E. 臉色蒼白.
- (A) 43. 下列各項為急性胰臟炎之不良預後指標，何者不是？
- A. 高膽紅素血症(hyperbilirubinemia).
 - B. 低白蛋白血症(hypoalbuminemia).
 - C. 低鈣血症(hypocalcemia).
 - D. 低氧血症(hypoxemia).
 - E. 周邊血液白血球數大於 20,000.

- (D) 44. 下列何種病毒性肝炎主要是經由血液傳染？
- A. B 型肝炎.
 - B. C 型肝炎.
 - C. D 型肝炎.
 - D. 1+2.
 - E. 以上皆是.
- (C) 45. 下列何者在臨床上，通常「不」被用來評估急性胰臟炎的嚴重程度和預後？
- A. 年齡.
 - B. 血液白血球計數.
 - C. 血清解脂 (lipase) 濃度.
 - D. 血清鈣離子濃度.
 - E. 血糖濃度.
- (B) 46. 請就本幻燈片所見，選出以下比較可能之診斷
病史：65 歲男性病人，主訴體重減輕，最近一年有大便習慣改變之情形，理學檢查發現右腹部有腫瘤樣東西。因此接受大腸鋇劑 X 光檢查。
- A. 絨毛狀腺瘤 (Villous adenoma).
 - B. 橫結腸癌瘤 (Cancer of transverse colon).
 - C. 腸套疊 (Intussusception).
 - D. 腸扭結 (Volvulus).
 - E. 結腸息肉 (Colon polyp).
- (B) 47. 當患者手掌如幻燈片所示時，其可能出現之併發症為下列何者？
- A. 周邊血液白血球數目異常升高.
 - B. 肝門脈高血壓.
 - C. 大腸多發性息肉.
 - D. 頻尿.
 - E. 咳血.
- (A) 48. 56 歲男性病人，每日喝紹興酒一瓶半，約已十年了。一週前主訴上腹疼痛並傳導至背部，當時血清澱粉 值為 1790 U/L，現再測血清澱粉 值為 1580 U/L，理學檢查可摸到

一腹部腫塊，病人生命徵象穩定，無發燒情形。電腹斷層顯示如圖，則您的診斷為？

- A. 酒精性急性胰臟炎併偽囊腫.
- B. 胰臟腫瘤.
- C. 腹膜後膿瘍.
- D. 胃潰瘍穿孔.
- E. 總膽管囊腫.

(A) 49. 幻燈片中所示腹部電腦斷層攝影之圖片，您將給予下列何種治療？

- A. 利尿劑.
- B. 化學療法 (chemotherapy).
- C. 輸注血小板.
- D. 放血 (phlebotomy).
- E. 補充鹽分.

(A) 50. 請就本幻燈片所見，選出以下比較可能之診斷。

病史：56 歲男性病人，最近數年常有上腹不適及疼痛之情形，使用“胃葯”即可改善，最近一星期突發高燒、嘔吐及黃疸。膽道碘劑攝影如幻燈片所示。

- A. 總膽管結石.
- B. 總膽管癌.
- C. 總膽管良性狹窄.
- D. Choledochal cyst.
- E. Caroli's disease.

(A) 51. 45 歲女性因劇烈上腹疼痛，嘔吐兩天而入院診治。血清澱粉酶值超過 1000 U/L (正常 60-180 U/L)。圖為其上腹部電腦斷層 X 光像，箭頭所指之細管狀構造為何？

- A. 胰管.
- B. 脾動脈.
- C. 脾靜脈.
- D. 後腹腔積液.
- E. 左側腎靜脈.

(B) 52. 站立之腹部 X 光攝影如幻燈片所示，可能是何種疾病？

- A. 急性膽囊炎.
- B. 肝膿瘍.

- C. 肝腫瘤.
 - D. 慢性胰臟炎.
 - E. 十二指腸潰瘍穿孔.
- (D) 53. 一位 78 歲男性，因上腹痛及解黑便，而接受上消化道鋇劑造影（如 Slide 所示）則下列何者為對？
- A. 上消化道造影，可見一鋇劑潴留在胃體部近大彎處
 - B. 鋇劑潴留處之四周可見有 rugae convergence 故考慮為良性潰瘍.
 - C. 胃之前庭部有息肉 (polyp).
 - D. 鋇劑潴留處之四周可見 rugae 之 emaciation, fusion 及 clubbing, 故考慮為惡性潰瘍.
 - E. 以上皆非.
- (E) 54. 一位 45 歲之男性病人因長期上腹痛、腹瀉而就醫，其腹部 X 光檢查之影像如下，其最有可能之診斷為何？
- A. 消化性潰瘍.
 - B. 胃腸不穩定性症候群 (Irritable bowel syndrome).
 - C. 缺血性大腸炎.
 - D. 主動脈剝離症.
 - E. 慢性胰臟炎.
- (E) 55. 下列何者與食道癌之發生無關？
- A. 過度飲酒
 - B. 抽煙
 - C. 慢性食道失弛緩症 (achalasia)
 - D. 逆流性食道炎
 - E. 維生素 E 缺乏
- (B) 56. 食道靜脈瘤破裂大量出血時，最優先的處理步驟？
- A. 緊急內視鏡診斷出血位置
 - B. 穩定生命徵象
 - C. 注射 Pitressin 或 sandostatin
 - D. 放置 Sengstaken-Blakemore tube
 - E. 食道靜脈瘤硬化或結紮術
- (C) 57. 逆流性食道炎 (reflux esophagitis) 之治療，何者除外？
- A. H₂-blocker

- B. Antacids
- C. Anticholinergics
- D. Omeprazole
- E. Metoclopramide

- (C) 58. 下列何種食道疾患,其病變部位主要不是發生在下端食道?
- A. 賁門失弛緩症(Achalasia)
 - B. 食道黏膜環(Schatzki's ring)
 - C. Zenker 氏憩室(Zenker's diverticulum)
 - D. 食道裂孔疝(Hiatal hernia)
 - E. 馬洛禮-魏斯症候群(Mallory-Weiss syndrome)
- (D) 59. 食道賁門失弛緩症(Achalasia)的病人,其臨床症狀除了吞嚥困難(dysphagia)及胸痛(chest pain)之外,較主要的症狀為
- A. 體重減輕
 - B. 呼吸困難 Dyspnea
 - C. 裏急後重 Tenesmus
 - D. 食物逆流 Regurgitation
 - E. 解黑色便 Melena
- (C) 60. Barrett's esophagus 指
- A. squamous carcinoma of esophagus
 - B. adenocarcinoma of esophagus
 - C. 食道的 squamous epithelium 為 columnar epithelium 所取代
 - D. esophageal stricture
 - E. reflux esophagitis
- (C) 61. 下列何者有誤?
- A. 逆流性食道炎(reflux esophagitis)嚴重時可造成食道管腔狹窄
 - B. 逆流性食道炎患者在生活上應建議禁煙
 - C. 巴瑞特食道(Barrett's esophagus)之臨床意義與逆流性食道炎一樣,沒有惡性的可能
 - D. 目前食道癌的治療方式,有採合併化學治療和放射性治療之趨勢

E.不能開刀之食道癌病人，對於其阻塞部份，可採用雷射或放置內管(prosthesis)來解除症狀。

(D) 62.Barrett's 食道與下列何種食道腫瘤有密切關聯?

- A.鱗狀細胞癌
- B.平滑肌瘤
- C.脂肪瘤
- D.腺癌
- E.淋巴瘤

(B) 63.下列何種疾病不會增加十二指腸潰瘍之罹患率?

- A.抽煙
- B.甲狀腺機能亢進
- C.慢性腎衰竭
- D.酒精性肝硬化
- E.慢性阻塞性肺疾

(C) 64.Zollinger-Ellison 症候群之敘述，何者不對？

- A.空腹血清之胃泌素(gastrin) >200 pg/ml
- B.因 gastrinoma 所引起
- C.Gastrinoma 好發於胃竇部(Antrum)
- D.常引致十二指腸或空腸之多發性潰瘍
- E.腹瀉是常見症狀之一

(A) 65.幽門螺旋桿菌(Helicobacter pylori)寄生於病人之：

- A.胃竇部黏膜層(mucosa)之上
- B.胃竇部黏膜層之內
- C.胃竇部黏膜下層(submucosa)
- D.幽門
- E.十二指腸球部

(C) 66.有關藥物引起之潰瘍，下列陳述何者有誤

- A.潰瘍可出現在胃或十二指腸
- B.可併發出血
- C.類固醇引起潰瘍已毫無爭論
- D.NSAID 是常見的藥物之一
- E.主要機轉是抑制黏膜前列腺素之合成

- (B) 67. 關於幽門螺旋桿菌(*Helicobacter pylori*)之陳述，以下何者有誤
- A. 十二指腸潰瘍病人，此菌之感染率高達 90-95%
 - B. 此菌不受胃酸破壞，大都穿透黏膜內寄生
 - C. 可引起急慢性胃炎
 - D. H₂ 拮抗劑不能清除此菌
 - E. 清除此菌可減少潰瘍之再發
- (A) 68. 下列有關胃的腺癌(adenocarcinoma)的敘述，那一項是不正確的?
- A. 胃的腺癌好發於胃大彎處(Greater curvature)(佔 50%)，而少數長在胃竇 (antrum)(佔 3%)
 - B. 肝臟、腹膜和肺臟是胃腺癌最易轉移的器官
 - C. 胃腺癌的轉移方式有直接浸潤，局部或遠端淋巴腺轉移，血行轉移，和直接播種至卵巢或腹膜
 - D. 絨毛狀腺性息肉有較高的機率轉變成腺癌
 - E. 少數胃腺癌呈現多發性
- (E) 69. 對於左一愛氏症候群(Zollinger-Ellison syndrome)的病人，下列那一種治療方法是不適用的方式?
- A. 全胃切除術 total gastrectomy
 - B. 組織胺 H-2 接受體拮抗劑
 - C. 質子幫浦阻斷劑 proton pump inhibitor
 - D. 高選擇性迷走神經切除術併用 H₂ 接受體拮抗劑
 - E. 三合療法 triple therapy
- (A) 70. 十二指腸潰瘍病人，最常見的併發症為
- A. 出血
 - B. 穿孔
 - C. 幽門阻塞
 - D. 胰臟炎
 - E. 逆流性食道炎
- (A) 71. 目前證據顯示，消化性潰瘍與何種細菌有密切關係?
- A. *Helicobacter pylori*
 - B. *Campylobacter jejuni*
 - C. *Clostridium difficile*
 - D. *Reptostreptococcus*

E. Bacteroid fragilis

- (C) 72. 有關原發性胃淋巴瘤的敘述，下列何者不正確
- A. 是最常見的淋巴結外的淋巴瘤(extranodal lymphoma)
 - B. 由B細胞來源(B-cell origin)者較多
 - C. 何杰金氏病 (Hodgkin's disease)佔較大多數
 - D. 預後比腺癌好
 - E. 整體而言，五年存活率約 40 to 60 %
- (C) 73. 有關壓力造成的胃腸道潰瘍和糜爛，下列何者正確？
- A. 最常見的症狀是上腹部疼痛
 - B. 常伴隨有胃酸分泌過多的現象
 - C. 粘膜缺血是最主要的致病機轉
 - D. 動物實驗，即使在無酸狀態下，也可能引發此類型的潰瘍病變
 - E. Cushing's ulcer 通常用來特指燙傷後產生的病變
- (D) 74. 下列何者通常不被用來治療十二指腸潰瘍？
- A. 制酸劑
 - B. 組織胺第二型阻斷劑
 - C. 抗副交感神經劑(抗乙酰膽鹼劑)
 - D. 抗交感神經劑
 - E. 前列腺素
- (D) 75. 控制胃壁細胞分泌胃酸的最後機構是：
- A. Histamine-2 receptor
 - B. Gastrin receptor
 - C. Cholinergic receptor
 - D. Proton pump (H⁺K⁺ ATPase)
 - E. Prostaglandins
- (D) 76. 血清胃泌素(gastrin)及胃酸增多患者，下列何種疾病之可能性最低
- A. Zollinger Ellison 症候群
 - B. 胃竇黏膜殘留症候群
 - C. 腎衰竭
 - D. 萎縮性胃炎
 - E. 胃竇 G 細胞功能亢進

- (B) 77. 上胃腸道出血優先處理之步驟為
- A. 緊急內視鏡檢
 - B. 靜脈注射、輸血或其他急救步驟使病況及生命徵兆先穩定
 - C. 血管攝影
 - D. 給予 H₂ 感受器拮抗劑注射
 - E. 注射維他命 C 或 K, 以加速凝血
- (A) 78. 下列何種原因之腹瀉為禁食即可自癒?
- A. 乳糖耐受不良
 - B. 細菌性腸炎
 - C. 大腸激躁症
 - D. 缺血性大腸炎
 - E. 潰瘍性大腸炎
- (B) 79. Pseudomembranous colitis 的治療，應使用
- A. tetracycline
 - B. vancomycin
 - C. clindamycin
 - D. cholestyramine
 - E. ampicillin
- (C) 80. 有關 Peutz-Jeghers syndrome 的敘述，下列何者不正確
- A. 是一種自體顯性遺傳
 - B. 唇和頰部有特徵性的黑色素斑點
 - C. 其胃腸道息肉是一種腺瘤(adenoma)
 - D. 息肉數目一般較家族性息肉症少
 - E. 產生惡性瘤的情況罕見，但並非沒有
- (E) 81. 以下有關潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis)及克隆氏症(Crohn's disease)的敘述何者為非?
- A. 較易出現瘻管的是 Crohn's disease
 - B. 有 skip area 的是 Crohn's disease
 - C. 病理切片中有 granuloma 的是 Crohn's disease
 - D. 整個腸壁都會受到侵犯的是 Crohn's disease
 - E. 容易併發大腸癌的是 Crohn's disease
- (D) 82. 下列何者遺傳性息肉疾病較無腸癌趨勢

- A. 家族性大腸息肉症(polyposis coli)
- B. Gardner's 症候群
- C. Turcot's 症候群
- D. 幼年性息肉症(Juvenile polyposis)
- E. 以上皆非

(D) 83. 下列有關於發炎性腸道疾病(inflammatory bowel disease)的敘述，何者為對

- A. 潰瘍性大腸炎主要侵犯小腸，而克隆氏(Crohn's)疾病主要侵犯直腸
- B. 瘻管形成是潰瘍性大腸炎常見的一種併發症
- C. 病理學上，潰瘍性大腸炎常造成穿透肌肉層的侵犯及形成肉芽腫
- D. 若發炎性腸道疾病病史超過十年以上，則癌症的危險性開始增加
- E. 以上皆非

(C) 84. 根據美國 NCI 提出大腸直腸癌預防注意事項下列何者是不正確的

- A. 減少脂肪攝取，以低於總能量 30%為佳
- B. 增加食物纖維攝取，每天 20 至 30 公克
- C. 減少水果及蔬菜之食用
- D. 避免過胖
- E. 適量飲酒

(A) 85. 關於 Crohn's colitis 之描述何者為誤?

- A. 病理檢視病變黏膜無 crypt abscess 特徵
- B. 易形成瘻管
- C. 病變黏膜有鵝卵石狀變化(cobblestoning)
- D. 病變黏膜有縱走狀潰瘍
- E. 有時合併結腸外病灶(extracolonic manifestation)

(E) 86. 那一種息肉症可合併骨瘤(osteoma)之形成?

- A. Peutz-Jeghers 症候群
- B. Juvenile polyposis
- C. Cronkite-Canada 症候群
- D. 家族性息肉症(familial polyposis coli)
- E. Gardner's 症候群

- (D) 87. 維他命 B12 吸收不良，和下列何者無關
- A. 萎縮性胃炎併發惡性貧血患者(pernicious anemia)
 - B. 胃切除(gastrectomy)
 - C. 小腸細菌增生(bacterial overgrowth)
 - D. 大腸癌患者
 - E. 迴腸(ileum)黏膜病變
- (E) 88. 當一個腹瀉患者同時併有關節炎時, 我們應考慮那些疾病之可能性?
- A. Ulcerative colitis
 - B. Crohn's disease
 - C. Whipple's disease
 - D. 以上皆非
 - E. 以上皆是
- (B) 89. 下列何種病毒容易造成慢性肝炎
- A. A, B, C 型肝炎病毒
 - B. B, C, D 型肝炎病毒
 - C. C, D, E 型肝炎病毒
 - D. A, B, E 型肝炎病毒
 - E. B, C, E 型肝炎病毒
- (B) 90. 下列何種病患，血清鹼性磷酸酵素(alkaline phosphatase)及 r-glutamyl transpeptidase (r-GT)會同時升高
- A. Paget's disease
 - B. 膽道結石
 - C. 懷孕後期
 - D. 急性腸炎
 - E. 以上皆是
- (C) 91. 與慢性 B 型肝炎帶原者之傳染性及其預後相關之病毒標記為：
- A. 表面抗原(HBsAg)
 - B. 核心抗原(HBcAg)
 - C. e 抗原(HBeAg)
 - D. 表面抗體 (Anti-HBs)

E. 核心抗體(Anti-HBc)

- (A) 92. 一位病人之血清生化學檢查結果如下：
Bilirubin (T/D)=4.5/2.5 mg/dL; A/G=2.8/3.5 gm/dL
alkaline phosphatase=278 U/L(正常<238); GOT (ALT)=
105 U/L (<31); GPT (ALT)= 85 U/L (<31)另外，
Prothrombin time=17.5/11.5 sec.，其最可能之診斷？
A. 肝硬化併有肝功能失償(decompensated liver cirrhosis)
B. 肝細胞癌(hepatocellular carcinoma)
C. 膽管細胞癌(cholangiocarcinoma)
D. 總膽管結石
E. 原發性膽汁滯留性肝硬化(primary biliary cirrhosis)
- (B) 93. 最近發展出新的檢驗試劑，發現以前所謂"非 A 非 B"型肝炎
炎主要由下列何者造成？
A. D 型肝炎病毒
B. C 型肝炎病毒
C. F 型肝炎病毒
D. 疹病毒
E. 巨細胞病毒(cytomegalovirus)
- (E) 94. 肝硬化合併症之一的肝性腦病變(hepatic encephalopathy)
之前驅因素(predisposing factors)，不包括下列何者？
A. 胃腸道出血
B. 利尿劑
C. 便秘
D. 電解質不平衡
E. 藥物 Lactulose
- (A) 95. 下列有關原發性膽管性肝硬化(primary biliary cirrhosis)的敘述，何者錯誤
A. 多發生於 35-60 歲男性。
B. 早期為無症狀或僅主訴皮膚癢(pruritus).
C. 在無症狀期，許多病患有 2-5 倍升高的血清鹼性磷酸酵素
(alkaline phosphatase)
D. 常伴有高血脂症(hyperlipidemia)

E. IgG antimitochondrial antibody 陽性佔 95%以上病患

- (C) 96. 下列有關肝硬化合併腹水(cirrhotic ascites)的敘述,何者錯誤?
- A. 門脈高壓(portal hypertension)及血清白蛋白過低(hypoalbuminemia)均為腹水形成原因.
 - B. 一般而言,每天減少 1.0kg 體重以下為標準是使用利尿劑治療腹水的原則.
 - C. 應鼓勵病患多走動,才能增加腎臟排去水份的能力(renal clearance of water).
 - D. 細菌腹膜炎(bacterial peritonitis)之發生,多數找不到原發病灶
 - E. 肝腎症候群(hepatorenal syndrome)病患的腎臟活體組織切片顯示正常
- (C) 97. 有關 A 型肝炎的敘述,下列何者正確?
- A. 其病原體為一種 DNA 病毒
 - B. 其傳染力在黃疸出現後最強
 - C. Anti-HAV 在血清 GPT 升高時可測得
 - D. 有少數病例轉變為慢性肝炎
 - E. 以上皆正確
- (E) 98. 有關肝細胞腺瘤(adenoma)的敘述,下列何者不正確?
- A. 幾乎都發生於女性
 - B. 通常是單發性的
 - C. 與口服避孕藥的使用有密切關聯
 - D. 若干例停用避孕藥後,病變可能縮小
 - E. 純粹是良性腫瘤,無惡性化的可能
- (C) 99. 有關口服避孕藥導致的肝傷害,下列何者不正確
- A. 會造成 BSP(bromosulphophthalein)滯留現象
 - B. 臨床症狀與懷孕時之原發性膽汁鬱積(idiopathic cholestasis of pregnancy)類似
 - C. 肝組織切片除可見膽汁鬱積外,門脈區通常也有發炎現象
 - D. 肝病變通常是可逆的
 - E. 主要導致病變的激素是雌性素(estrogen)
- (C) 100. Budd-Chiari Syndrome 指

- A. Portal vein thrombosis
- B. Hepatic artery occlusion
- C. Hepatic vein occlusion
- D. Splenic vein occlusion
- E. Superior vena cava occlusion

(D) 101. 小型肝癌篩檢, 使用何者檢查最佳

- A. CT scan
- B. 核子醫學掃描
- C. 血管攝影
- D. 超音波
- E. MRI

(D) 102. 下列何項為陽性者最可能診斷為急性 B 型肝炎?

- A. HBsAg
- B. HBeAg
- C. Anti-HBe
- D. Anti-HBc, IgM
- E. Anti-HBs

(B) 103. 下列何者之病原為 DNA 病毒?

- A. A 型肝炎
- B. B 型肝炎
- C. C 型肝炎
- D. D 型肝炎
- E. E 型肝炎

(E) 104. 下列何者不是猛爆性肝衰竭的原因

- A. 急性病毒性肝炎
- B. 藥物過量, 如 Acetaminophen
- C. 妊娠急性脂肪肝(Acute fatty liver of pregnancy)
- D. 威爾遜氏(Wilson)病
- E. 血吸蟲病(Schistosomiasis)

(D) 105. 下述何種疾病最不可能與肝細胞癌發生有關?

- A. Hemochromatosis
- B. 慢性 B 型肝炎感染
- C. 慢性 C 型肝炎感染

- D.A 型肝炎感染
- E.黃麴毒素

(C) 106. 下列何者不是肝硬化的原因

- A.B 型肝炎
- B.C 型肝炎
- C.E 型肝炎
- D.血色素沈著症(hemochromatosis)
- E.威爾遜氏(Wilson)病

(C) 107. 假如病人血清檢查呈現 HBsAg 陽性，Anti-HBs 陰性，HBeAg 陰性，IgG Anti-HBc 陽性，下列何者為正確診斷？

- A.急性 B 型肝炎病毒感染，且高傳染性
- B.假陽性 B 型肝炎反應
- C.晚期急性 B 型肝炎病毒感染，低傳染性
- D.已從 B 型肝炎病毒感染復原
- E.為 B 型肝炎核心抗體產生前之空窗期(core window)

(B) 108. 下列黃疸(jaundice)的病因中，何者形成非結合性高血清膽紅素症(unconjugated hyperbilirubinemia)?

- A.Dubin-Johnson syndrome
- B.Gilbert's syndrome
- C.Recurrent jaundice of pregnancy
- D.Benign familial recurrent cholestasis
- E.Common bile duct tumors

(B) 109. 病人因高燒、畏寒至急診處求醫，理學檢查發現肝腫大且有觸痛，驗血可見白血球過多且其分類顯示主要為多核性顆粒球(polymorphonuclear cells)，其最可能之診斷為

- A.急性膽囊炎
- B.肝膿瘍
- C.急性腹膜炎
- D.急性盲腸炎
- E.急性胃腸炎

(A) 110. 關於膽囊結石，下列何者錯誤？

- A.腹部 x-光攝影(plain abdomen)是診斷膽囊結石的好方法
- B.有症狀的膽囊結石，應施行膽囊切除

- C. 無症狀的膽囊結石，不必施行預防性膽囊切除
- D. 碎石術併用化石藥物治療不適用於大部分中國患者
- E. 無石性膽囊炎發生併發病的機率高於結石性的膽囊炎

(D) 111. 急性膽道炎所引起的 Charcot's 三徵，是指那三項？

- A. 膽道性絞痛+嘔吐+黃膽
- B. 膽道性絞痛+嘔吐+腹瀉
- C. 膽道性絞痛+黃膽+腹瀉
- D. 膽道性絞痛+黃膽+尖峰狀發燒及畏寒
- E. 黃膽+腹瀉+尖峰狀發燒及畏寒

(C) 112. 內視鏡逆行性膽胰管攝影術(ERCP)之併發症不包括：

- A. 出血
- B. 穿孔
- C. 十二指腸潰瘍
- D. 胰臟炎
- E. 膽管炎

(E) 113. 有關膽石性腸阻塞(gallstone ileus)下列那一敘述不正確？

- A. 通常有膽囊腸道 管(cholecystoenteric fistula)存在
- B. 管通常位於十二指腸
- C. 多數病人並無明顯膽囊炎的症狀
- D. 結石直徑大於 2.5 公分以上者較易導致 管形成
- E. 腸阻塞部分最常在空腸中段

(A) 114. 以下有關急性胰臟炎的敘述，何者為非？

- A. 血液中 amylase 的高低與預後有關
- B. 血液中 sugar 的高低，與預後有關
- C. 大部份的病人只須要保守性的治療即可
- D. 腹部超音波檢查，胰臟正常，並不能排除急性胰臟炎的診斷
- E. 約 15%的病人會併發偽囊腫(pseudocysts)

(E) 115. 下列關於急性胰臟炎的敘述何者為非

- A. 病人平躺時，腹痛可能加重
- B. 常有輕度發燒、心跳加速
- C. 血清澱粉酵素濃度和胰臟炎之嚴重程度並無密切關係

- D. 大多數病人的急性胰臟炎可自然緩解
- E. 大多數病人有血清低血鈣現象

(E) 116. 台灣地區造成急性胰臟炎最主要的原因是

- A. 酗酒
- B. 藥物
- C. 高血脂症
- D. 外傷
- E. 膽道結石

(E) 117. 下列何者不是急性病毒性肝炎預後差的指標

- A. 腦病的徵狀及徵象出現
- B. 凝血素原時間增長超過 4 秒
- C. 血漿葡萄糖濃度低於 50 mg/dl
- D. 血清全膽紅素值高於 20 mg/dl
- E. 血清氨基丙酸氨基轉換素(ALT)大於 2500 IU/L

(E) 118. 下列何者不是肝細胞癌的原因

- A. 肝硬化
- B. 黴菌毒素(aflatoxin)
- C. 乙型肝炎病毒
- D. 丙型肝炎病毒
- E. Acetaminophen

(C) 119. 施行內視鏡逆行性膽胰管攝影術(簡稱 E.R.C.P.), 最常見的併發症是何項?

- A. 膽道炎及腸胃道出血
- B. 胰臟炎及腸胃道穿孔
- C. 膽道炎及胰臟炎
- D. 肝膿瘍及胰臟炎
- E. 腸胃道出血及穿孔

(E) 120. 成人急性腸阻塞最常見的原因?

- A. 惡性腫瘤
- B. 藥物
- C. 憩室
- D. 腸套疊或扭轉
- E. 黏連或疝氣

(B) 121. 預後最佳之胃腸道腫瘤?

- A. 食道癌
- B. 原發性胃淋巴瘤
- C. 胃腺癌
- D. 大腸腺癌
- E. 小腸惡性平滑肌瘤

(C) 122. 最易惡化之大腸息肉?

- A. hyperplastic polyp
- B. tubular polyp
- C. villous polyp
- D. juvenile polyposis
- E. recurrent polyp

(E) 123. 逆流性食道炎的治療目標, 首先是減少胃液逆流, 包括以下步驟

- A. 減輕體重
- B. 床頭升高
- C. 避免煙酒及油膩食物
- D. 避免使用鈣離子阻斷劑
- E. 以上皆是

(E) 124. 下列何者與胃食道靜脈瘤出血較無相關?

- A. 門脈高壓的嚴重度
- B. 靜脈瘤的大小
- C. Child-Pugh score
- D. 紅色徵症(Red color signs)
- E. 靜脈瘤上有發炎糜爛(esophagitis and erosion)

(C) 125. 下列有關十二指腸潰瘍的敘述那一個是不正確的?

- A. 十二指腸潰瘍好發於距幽門(pyloric ring)3公分內的球部
- B. 十二指腸潰瘍的併發症是出血(hemorrhage), 穿孔(perforation)及球部阻塞(obstruction)等
- C. 手術治療多使用於十二指腸潰瘍合併併發症時, 而高度選擇性迷切術(highly selective vagotomy)是最好的手術方式

- D. 絕大部份的十二指腸潰瘍可以內科療法治療而使潰瘍癒合
- E. 十二指腸潰瘍不一定會有徵狀,而且部份會自行癒合,不需藥物治療

(E) 126. 下列有關食道癌的敘述,那一項是不正確的?

- A. 90%的食道癌病人有吞嚥困難(dysphagia)的徵狀
- B. 食道癌的分佈中,上三分之一段佔 10~20%,中三分之一段佔 50%,而下三分之一段佔 30~40%
- C. 90%以上的食道癌是屬於鱗狀上皮癌(squamous cell carcinoma)
- D. 食道癌的轉移可經由局部侵犯(direct extension),淋巴管道轉移(lymphatic metastasis)和血行轉移(hematogenous metastasis)
- E. 食道癌沒有多時性的(metachronous)或同時的(synchronous)腫瘤病變

(D) 127. 目前治療膽道結石的方法何者為誤?

- A. 口服膽汁治療(Oral bile acid therapy)大致上對色素結石無效
- B. Methyl tertiary butyl ether 可用來作直接接觸溶石術(Direct contact dissolution therapy)中之溶劑
- C. 為數眾多,體積碩大(大於 3cm),X 光影像上非透明之膽石以外科手術處理為佳
- D. 體外震波碎石(Electrohydraulic extracorporeal shock wave lithotripsy)加上內科溶石術可用來治療色素結石
- E. 以內科溶石術處理之膽石病患,於膽石完全消失後仍有膽石復發的可能

(D) 128. 下列何者不會導致血清阿爾發胚胎蛋白(α -fetoprotein)的濃度上升

- A. 肝癌
- B. 來自腸胃道腫瘤的肝臟轉移性瘤
- C. 急性或慢性病毒性肝炎
- D. 母親懷孕六星期前的血清
- E. 生殖細胞(germ cell)瘤

(D) 129. 關於酒精性或膽石性急性胰臟炎,下列何者不正確?

- A. 理學檢查時腹部可以出現反彈痛(rebound pain)的現象

B. 當血脂過高時(hypertriglyceridemia),血液澱粉酶值可能偽性正常

C. 評估嚴重度,腹部斷層掃描優於腹部超音波掃描

D. 性別是影響預後的指標之一

E. 年齡是影響預後的指標之一

(D) 130. 50 歲男性發現之肝腫瘤,其肝機能 GOT=85u/l,GPT=60u/l, Bi1=0.8mg%,A/G=3.5/2.0gm%,無腹水,HBeAg(+), prothrombin time 正常,意識清楚,腫瘤位於第 2 小葉者為 3 公分,第 5 小葉側面者為 2 公分,門靜脈正常,但非癌處之肝臟組織為肝硬化,試問下列何種治療最不適宜

A. 手術切除

B. 肝腫瘤純酒精注射

C. 肝動脈栓塞治療

D. 肝移植

E. 肝腫瘤高張食鹽水治療或熱治療

(B) 131. 下列何者最適合接受肝移植手術?

A. 35 歲男性因下腔靜脈阻塞而肝腫大、腹水

B. 26 歲女性因藥物性猛爆性肝炎而黃疸上昇

C. 48 歲酒精性肝硬化男性,已禁酒 3 個月

D. 40 歲女性,e 抗原陽性肝硬化

E. 50 歲男性,8 公分大之尾葉原發性肝細胞癌

(A) 132. 下列有關於缺血性大腸炎(ischemic colitis)之描述,何者是不正確的?

A. 最常見的臨床表現為急性猛爆性(acute fulminant)者,呈現腹痛,直腸出血,休克現象

B. 左側大腸常被侵犯,但直腸則往往罕見有黏膜變化出現

C. 血管造影 X 光攝影往往幫忙不大,因為大部份屬非阻塞性血管病變

D. 亞急性缺血性大腸炎(subacute ischemic colitis)最為常見,腹痛與出血較輕,不一定要手術

E. 手術只要是治療狹窄,阻塞或較嚴重之病例切除已壞死之腸子才需要考慮

(C) 133. 下列有關各種大腸息肉症之描述,何者是不正確的?

A. 增生性息肉(hyperplastic polyp)常為無莖性,小於半公

分,臨床上不具病理意義

- B. 家族性大腸多發性息肉症(familial colonic polyposis)之息肉有惡性變化之可能
- C. 幼年型多發性息肉症(juvenile polyposis)發生癌化之可能性很高
- D. Peutz-Jeghers 症候群(Peutz-Jeghers syndrome)少見有惡性化之變化
- E. Gardner 氏症候群(Gardner's syndrome)之息肉屬腺腫性息肉,有癌化之可能

(A) 134. 淋巴結外(extranodal)的淋巴瘤,最常侵犯

- A. 胃
- B. 迴腸
- C. 空腸
- D. 肝
- E. 大腸

(D) 135. Zenker's diverticulum 見於食道的

- A. 下 1/3
- B. 中 1/3
- C. anterior hypopharyngeal wall
- D. posterior hypopharyngeal wall
- E. esophagogastric junction

(C) 136. Turcot's syndrome 是指大腸裏有 adenomatous polyp 以及

- A. 長骨上有 osteoma
- B. 皮膚上有 lipoma
- C. 腦瘤
- D. 以上全對
- E. 以上全不對

(D) 137. 下列有關下食道環(Schatzki's ring)的敘述,何者不正確?

- A. 通常位於食道下端扁平上皮和胃柱狀上皮的交界之間
- B. 導致吞嚥困難等症狀的頻率不高
- C. 具特徵性的病史是建立診斷的最重要指引
- D. 內視鏡檢查是確定診斷的最佳工具

E. 最狹處直徑若小於 12mm, 需施予穿通治療

(C) 138. 下列何種藥物, 通常不被用來治療胃食道逆流疾病?

- A. 制酸劑
- B. 類乙醯膽鹼劑(parasympathomimetics or cholinergics)
- C. 抗乙醯膽鹼劑(anticholinergics)
- D. 組織胺第二型阻斷劑(H₂ antagonists)
- E. 質子唧筒阻斷劑(proton pump inhibitors)

(D) 139. 下列何種物質或狀況可能導致分泌性腹瀉(secretory diarrhea), 除了:

- A. 腸毒素(enterotoxin)
- B. 膽汁酸(bile acids)
- C. 小腸淋巴瘤(intestinal lymphoma)
- D. lactulose 治療
- E. 類癌症候群(carcinoid syndrome)

(E) 140. 有關潰瘍性結腸炎併生大腸癌的敘述, 下列何者不正確

- A. 全大腸炎較左側大腸炎產生機率高
- B. 即使潰瘍性結腸炎長期不活動, 仍可能併生大腸癌
- C. 潰瘍性結腸炎的初期症狀與是否發生腸癌無關
- D. 針對潰瘍性結腸炎의各種內科治療法, 與是否發生腸癌無關
- E. 大腸癌只發生在有明顯潰瘍性結腸炎病變的粘膜上

(A) 141. 有關肝門脈高壓症(portal hypertension)的敘述, 下列何者不正確?

- A. 正常人肝門脈壓力約 10-15 厘米水銀柱高
- B. 肝門靜脈系統中缺乏靜脈瓣(valve), 使其易於在血流受阻後, 形成側枝循環
- C. 肝靜脈楔壓(wedged hepatic vein pressure)在竇前性肝門脈高壓症(presinusoidal portal hypertension)通常正常
- D. 肝硬化是肝門脈高壓症最常見的原因
- E. Budd-Chiari syndrome 是一種竇後性(postsinusoidal)肝門脈高壓症

(E) 142. 一般來說, 慢性胰臟炎, 外分泌機能(例如 lipase 的分泌)破

壞到何種程度,會出現脂肪下痢(steatorrhea)的現象

- A. 10%以上
- B. 30%以上
- C. 50%以上
- D. 70%以上
- E. 90%以上

(D) 143.有關無結石性膽囊炎(acalculous cholecystitis),下列那一敘述是正確的

- A. 約佔所有急性膽囊炎患者的 5-10%
- B. 臨床症狀與結石性膽囊炎類似
- C. 發生併發症的比例較結石性膽囊炎低
- D. (1) + (2)
- E. (1) + (2) + (3)

(B) 144.下列何種物質或狀況被認為與大腸癌症的產生無關

- A. 動物性脂肪
- B. 鈣質
- C. 低纖維飲食
- D. 遺傳性腸息肉症
- E. 輸尿管乙狀結腸吻合術(ureterosigmoidostomy)

(C) 145.下列的大腸疾病裏,那一個是明顯的癌病前灶

- A. juvenile polyp
- B. hyperplastic polyp
- C. adenomatous polyp
- D. 以上皆是
- E. 以上皆非

(D) 146. Gardner's syndrome 通常發現息肉在

- (A) 食道(B) 胃(C) 小腸(D) 大腸
- A. A + B
- B. A + C
- C. B + C
- D. C + D
- E. B + D

(B) 147. Juvenile polyposis 的患者常常在

(A)食道(B)胃(C)小腸(D)大腸

發現有 Hamartoma

A.A + B + C

B.B + C + D

C.C + D

D.D

E.以上皆非

(E) 148. Peutz-Jeghers syndrome 的患者,皮粘膜上可發現褐色斑點,並時常在下列器官發生腫瘤,除了:

A. 卵巢

B. 乳房

C. 胰臟

D. 子宮內膜

E. 胃臟

(B) 149. Gardner's syndrome 包括下列各項病灶,除了:

A. Epidermoid cyst

B. Endometrial tumors

C. Osteoma

D. Fibroma

E. Lipoma

(E) 150. Non-polyposis syndrome 係一項遺傳疾病,它的病灶在

A. 胃臟

B. 十二指腸

C. 空腸

D. 迴腸

E. 大腸

(A) 151. 嗜伊紅性腸炎(eosinophilic enteritis)疾病裏之粘膜病灶型患者,其症狀包括(A)缺鐵性貧血(B)血清白蛋白短少(C)脂漏(D)胃粘膜變厚(E)幽門阻塞

A.A + B + C

B.D

C.B + D

D.B + D + E

E.A + B + C + D + E

- (A) 152. Eosinophilic enteritis 疾病漿膜下病灶型患者, 其主要的症狀為?
- A. 有腹水而且腹水裏含很多的嗜伊紅球
 - B. 脂漏
 - C. 幽門阻塞
 - D. 缺鐵性貧血
 - E. 以上皆對
- (D) 153. Eosinophilic enteritis 疾病患者中之肌層病灶型, 其症狀包括(A)缺鐵性貧血(B)血清白蛋白短少(C)脂漏(D)胃粘膜增厚(E)幽門阻塞
- A. A
 - B. B
 - C. A + B
 - D. D + E
 - E. A + B + C
- (C) 154. Crohn's disease 的主要病灶發生在
- A. 胃臟
 - B. 十二指腸
 - C. 迴音瓣膜(ileocecal valve)
 - D. 大腸
 - E. 直腸
- (E) 155. 潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis)的病灶侵犯直腸者達
- A. <1%
 - B. <5%
 - C. 10-20%
 - D. 50-80%
 - E. 大於 95%
- (D) 156. 肉芽腫(granuloma)是 Crohn's disease 的主要病理變化, 但它的發現率只有:
- A. <1%
 - B. <5%
 - C. 10-20%
 - D. 50--60%

E.80-100%

(A) 157. 下列有關於食道鬆懈不能(Achalasia)之敘述,何者為非:

- A. 它是一種食道橫紋肌的運動障礙
- B. 吞嚥困難、胸痛及返流是它的主要症狀
- C. 若作食道鋇劑造影,則食道末梢呈現如"鳥喙"般的持續狹窄
- D. 若作食道的壓力測試(manometry),則下食道括約肌的基礎壓呈現正常或升高的現象
- E. 治療方面可以嚐試使用食道氣球擴張術來降低下食道括約肌的基礎壓

(B) 158. 下列敘述何者為非

- A. 絕大多數非 A 非 B 型輸血後肝炎都是由 C 型肝炎病毒所引起的
- B. C 型肝炎病毒是屬於 DNA 病毒
- C. C 型肝炎病毒大小約在 30-60nm 範圍
- D. C 型肝炎病毒的高度可變區(hypervariable region)是位於它的 E2/NS1 位置
- E. 目前僅可偵測 C 型肝炎病毒抗體(anti-HCV),仍無法偵測 C 型肝炎病毒抗原

(E) 159. 胃黏膜的黏液膠層,主要是利用下列何種電解質來中和氫離子,而達到保護胃壁細胞的效果

- A. 鈉離子
- B. 鉀離子
- C. 氯離子
- D. 鈣離子
- E. 重碳酸根離子(HCO_3^-)

(C) 160. 下列有關於幽門螺旋桿菌(Helicobacter pylori)的敘述,何者為非:

- A. 它是屬於微嗜酸性的格蘭氏陰性菌
- B. 幾乎所有活動性慢性胃炎(active chronic gastritis)病患都可找到此菌
- C. 它寄生於胃壁細胞層內
- D. 快速尿素綉(Urease)試驗可用來診斷此菌之存在
- E. 膠狀鉍鹽與某些抗生素(如 metronidazole)合用對於根除

此菌可達到不錯的效果

- (C) 161. 下列有關於十二指腸潰瘍的藥物治療機轉,何者為非
- A. Famotidine 是屬於組織胺第二型(H-2)接受器阻斷劑
 - B. Omeprazole 是質子幫浦(proton pump)阻斷劑
 - C. Sucralfate 的作用主要是中和胃酸及降低胃酸分泌
 - D. 前列腺素類製葯(尤其是 E 系列)可用於預防非類固醇抗發炎葯物(NSAID)所引起的潰瘍
 - E. 以上皆是
- (B) 162. 診斷膽結石的最佳初步工具為何
- A. 腹部 X 光攝影
 - B. 腹部超音波
 - C. 電腦斷層掃描(CT)
 - D. 核磁共振攝影(MRI)
 - E. 口服膽囊攝影(OC)
- (C) 163. 若癌細胞已侵犯至大腸的漿液層(serosa),但並未侵犯到局部淋巴結,則屬於修正過的杜克氏(Dukes)分類中那一級
- A. A
 - B. B1
 - C. B2
 - D. C
 - E. D
- (D) 164. 有關食道癌的敘述,何者為非
- A. 最常發生於食道中段
 - B. 最常見的細胞型態是上皮細胞癌(squamous cell carcinoma)
 - C. Tylosis palmaris 與食道癌有關
 - D. 放射線治療(radiation therapy)效果通常不好
 - E. 五年的存活率小於 5%
- (B) 165. 關於十二指腸潰瘍,以下敘述何者錯誤?
- A. 癒合後,約 80-90%會在二年內復發
 - B. 約 90-95%可在十二指腸找到幽門桿菌(Helicobacter pylori)
 - C. 約 5%是發生在十二指腸球部的遠端

- D. 臨床上,病人不一定有症狀
- E. 在慢性阻塞性肺病(COPD)的病人,其發生率較高

(E) 166. 下列敘述何者正確?(A) 飲酒,膽結石,藥物及副甲狀腺功能低下,均可造成急性胰臟炎(B) 急性胰臟炎後產生之偽囊腫(pseudocyst),直徑大於 5 公分,持續超過 6 週者,自己消失的機會很小(C) 慢性胰臟炎常與飲酒有關,脂瀉(steatorrhea)為其內分泌功能缺損之表徵(D) 胰臟癌之發生以體部最多。而發生於頭部者則以黃疸表現最多(E) 胰臟癌可以血清中癌胚胎抗原(CEA)及糖鎖抗原(CA19-9)為腫瘤標誌

- A. (A) + (B) + (D) + (E)
- B. (B) + (D) + (E)
- C. (C) + (D) + (E)
- D. (A) + (C) + (E)
- E. (B) + (E)

(D) 167. 對於血清 e 抗原陽性之慢性 B 型肝炎患者(血清 GPT 值大於正常上限兩倍以上), α 干擾素(interferon)已經被證實可使部分患者血清 e 抗原轉換成 e 抗體,且肝功能恢復正常,以後病情呈現穩定狀態,病人變成健康帶原者。請問其有效之百分比大約為多少?(每週三次,每次注射 500 萬單位,打滿 6 個月)

- A. >90%
- B. 80~90%
- C. 60~80%
- D. 30~40%
- E. <10%

(B) 168. 下列何者非肝硬化之併發症?

- A. 肝門脈高血壓(Portal hypertension)
- B. 肝血管瘤(Hepatic hemangioma)
- C. 食道靜脈曲張出血(Esophageal varices bleeding)
- D. 肝性腦病變(Hepatic encephalopathy)
- E. 肝腎症候群(Hepatorenal syndrome)

(D) 169. 肝性腦病變(Hepatic encephalopathy)之誘發因子,下列何者不是?

- A. 胃腸道出血
- B. 血鉀過低(Hypokalemia)
- C. 感染
- D. 血鈉過低(Hyponatremia)
- E. 食用太多蛋白質

(C) 170. 處理胃腸道出血病人, 首先要:

- A. 安排胃鏡檢查
- B. 測血色素
- C. 評估病人的血行狀態
- D. 安排胃十二指腸鉭餐檢查
- E. 安排大腸鉭鹽檢查

(D) 171. 下列何種營養素不在近端小腸吸收?

- A. 脂肪
- B. 鐵
- C. 鈣
- D. 膽鹽
- E. 葉酸

(E) 172. 一 30 歲病人因意識不清而被送至急診室, 隨行家屬謂其有肝病過去史, 最近幾天曾解瀝青大便(tarry stool), 理學檢查發現其肝臟較小, 請問其最可能之診斷為下列何者?

- A. 貧血
- B. 血糖過高
- C. 電解質不平衡
- D. 腦出血(cerebral hemorrhage)
- E. 肝昏迷(hepatic encephalopathy)

(B) 173. Schilling 試驗是用於診斷

- A. 不明原因的胃腸道出血
- B. Cobalamine (B12) 的吸收障礙
- C. 胃食道逆流疾病(gastroesophageal reflux disease)
- D. 蛋白質流失腸病變(protein-losing enteropathy)
- E. 愛滋病(AIDS) 胃腸道感染

(C) 174. Mirrizi's 症候群, 與下列何種膽道疾病有關?

- A. 膽囊結石(Gallbladder stone)

- B.肝內結石(Intrahepatic duct stone)
- C.膽囊管結石(Cystic duct stone)
- D.總膽管結石(Common bile duct stone)
- E.膽管癌(Bile duct carcinoma)

(A) 175. 下列何者與急性胰臟炎之預後無關?

- A.Serum amylase > 2,000 Somogi unit
- B.Serum calcium < 8 mg/dl
- C.WBC > 18,000/cumm
- D.LDH > 600IU/L
- E.BUN > 96mg/dl

(C) 176. 下列何者與急性胰臟炎之發生無關?

- A.Hypertriglyceridemia
- B.Abdominal blunt injury
- C.Hypocalcemia
- D.Gall stones
- E.Ischemia-hypoperfusion

(D) 177. 慢性 B 型肝炎患者,其血清 e 抗原(HBeAg)陽性,最近突然出現右上腹痛及黃疸。其血清生化學結果如下:

GOT(AST)=185U/L(正常<31);GPT(ALT)=174U/L(<31)
A/G=4.0/3.5gm/dL;Bilirubin(T/D)=8.5/5.5mg/dL;
Alkaline phosphatase=530U/L(<238),r-GT=287(<70)

其診斷最可能為下列何者?

- A.Chronic active hepatitis with acute exacerbation
- B.Chronic hepatitis B combined with alcoholic liver disease
- C.Decompensated liver cirrhosis
- D.Obstructive jaundice due to impaction of CBD stone
- E.Chronic hepatitis B complicated with Delta virus superinfection

(E) 178. 下列關於胰管癒合不全(pancreas divisum)之敘述,何者為非

- A.是一種先天性的解剖異常
- B.發生率 4~12.5%
- C.常構成慢性胰臟炎

- D. 胰液經由副乳頭排出
- E. Wirsung 管開口於副乳頭

(D) 179. 因膽結石引起急性胰臟炎, 下列何種處理可迅速改善患者的預後

- A. 鼻胃管抽液術
- B. 腹膜透析
- C. 注射 glucagon, 或 somatostatin 抑制胰液分泌
- D. 經內視鏡乳頭切開取石術
- E. 以上皆是

(B) 180. 下列何種腸道息肉症與家族遺傳無關

- A. Peutz-Jeghers syndrome
- B. Cronkite-Canada syndrome
- C. Conden's syndrome
- D. Juvenile polyposis
- E. Tucot's syndrome

(C) 181. 下列何者有關炎性腸道疾病(inflammatory bowel disease)之說法是不正確的

- A. 克隆氏症(Crohn's disease)以抽煙病患較多, 潰瘍性腸炎以不抽煙者較多
- B. 潰瘍性腸炎(ulcerative colitis)多在直腸有病灶, 但不會發生在迴腸
- C. 潰瘍性腸炎容易併發 管
- D. 潰瘍性腸炎病灶多為連續性, 克隆氏症則多為非連續性病灶(skip lesions)
- E. 潰瘍性腸炎和克隆氏症都會發生直腸出血

(C) 182. 下列何種有關胃的運動功能之說法是錯誤的

- A. 液體排空比固體快
- B. 生理食鹽水排空比葡萄糖溶液快
- C. 胃竇部控制液體排空, 胃底部控制固體排空
- D. 不同的物質是由各種化學感受器(chemoreceptor)來管制在胃內排空
- E. 遠側胃功能是研磨食物至小於 1mm 微粒, 以便排空

(E) 183. 下列何種手術治療消化性潰瘍, 引起胃快速排空症候群

(Dumping syndrome)之發生率最低

- A. 亞全胃切除及畢爾羅氏第一型接合術
(Subtotal gastrectomy with Billroth I anastomosis)
- B. 亞全胃切除及畢爾羅氏第二型接合術
(Subtotal gastrectomy with Billroth II anastomosis)
- C. 迷走神經幹切斷術及幽門整形術
(Truncal vagotomy and pyloroplasty)
- D. 迷走神經幹切斷術及胃竇切除術
(Truncal vagotomy and antrectomy)
- E. 近側胃內迷走神經切斷術
(Proximal gastric vagotomy)

(B) 184. 下列何種檢查為診斷幽門曲狀桿菌(*Helicobacter pylori*)感染之方法

- A. 血液培養, 胃切片尿素綉試驗, 胃切片病理檢查, 血清抗體檢查
- B. 13C 尿素呼吸試驗, 胃切片尿素綉試驗, 胃切片病理檢查, 血清抗體檢查
- C. 13C 尿素呼吸試驗, 血液培養, 血清抗體檢查, 胃切片病理檢查
- D. 胃切片尿素綉試驗, 血液培養, 血清抗體檢查, 13C 尿素呼吸試驗
- E. 血液培養, 胃切片尿素綉試驗, 13C 尿素呼吸試驗, 胃切片病理檢查

(E) 185. 肝性腦症(Hepatic encephalopathy)與下列何者明顯無關?

- A. 血中氨(Ammonia)大量增加
- B. 中樞神經系統大量合成 false neuro-transmitters
- C. 大量 GABA (Gamma-aminobutyric acid)進入腦部
- D. Blood-brain barrier 的完整性受損
- E. 腦中芳香族氨基酸(Aromatic amino acid)減少

(E) 186. 食道癌的發生與下列何者最無關連性

- A. Barrett 上皮
- B. 逆流性食道炎
- C. 食道失弛緩症(Achalasia)
- D. 食道腺瘤(Adenoma)

E. 食道乳突樣瘤(papilloma)

(B) 187. 原發性肝細胞癌與下列何者絕對無關

- A. B 型或 C 型肝炎
- B. A 型肝炎
- C. Aflatoxins
- D. α 1-antitrypsin 缺乏症
- E. Androgenic steroid

(C) 188. 下列何種藥品或化學品與肝硬化的形成絕對無關?

- A. Methyldopa
- B. Isoniazid
- C. Ampicillin
- D. Carbon tetrachloride
- E. Vitamin A

(A) 189. 下列何者與慢性肝炎的發生無關?

- A. Hepatitis A Virus
- B. Hepatitis B Virus
- C. Hepatitis C Virus
- D. Hepatitis D Virus
- E. 乙醇

(E) 190. 非類固醇抗炎藥(NSAID)引起消化性潰瘍之機序與下列何者無關?

- A. 抑制前列腺素(prostaglandins)合成
- B. 降低胃粘液及 bicarbonate 之分泌
- C. 降低胃粘膜血流(Gastric mucosal blood flow)
- D. 減緩細胞的再生率
- E. 刺激壁細胞分泌胃酸

(C) 191. 下列何藥對大腸收縮力(contractility)有促進作用

- (A) metoclopramide
- (B) domperidone
- (C) cisapride
- A. (A) + (B)
- B. (B) + (C)
- C. (A) + (C)

D. (A) + (B) + (C)

E. 以上皆非

(D) 192. pancreatic cholera syndrome 之腹瀉之 secretory stimulant 為何?

A. substance P

B. serotonin

C. prostaglandin

D. VIP

E. 以上皆非

(C) 193. Bile salt 主要是由消化道何部位吸收?

A. duodenum

B. jejunum

C. ileum

D. 以上皆是

E. 以上皆非

(E) 194. 下列何者組織學上不是 adenoma?

A. Familial colonic polyposis

B. Gardner's syndrome

C. Turcot's syndrome

D. Non-polyposis syndrome

E. Peutz-Jeghers syndrome

(C) 195. 下列何者不常見於克隆氏病(Crohn's disease)

A. 非連續性病變(skip area)

B. 肉芽腫(granuloma)

C. 侵犯直腸

D. 管形成

E. 血便

(D) 196. 下列何類病人罹患 E 型肝炎時, 死亡率最高?

A. 小孩

B. 中年人

C. 老年人

D. 懷孕婦女

E. 黑人

- (C) 197. 正常肝門靜脈的壓力為?mmHg
- A. 1~2
 - B. 3~5
 - C. 7~10
 - D. 12~15
 - E. 17~20
- (E) 198. 膽囊切除後症候群(postcholecystectomy syndrome)常見之原因
- A. 膽管殘留結石
 - B. 俄狄氏括約肌功能異常
 - C. 膽囊管殘留過長
 - D. 膽道狹窄
 - E. 以上皆是
- (A) 199. 下列何種藥物引起的肝病變屬於特異體質反應 (Idiosyncratic reaction)
- A. Halothane
 - B. Acetaminophen
 - C. Carbon tetrachloride
 - D. Alcohol
 - E. 以上皆是
- (A) 200. 有關激膽素(cholecystikin)與膽道系統之關係,下列那一項是錯誤?
- A. 激膽素由膽囊粘膜分泌
 - B. 它促進膽囊收縮
 - C. 使奧迪氏括約肌(sphincter of oddi)鬆弛
 - D. 增加肝內膽汁之分泌
 - E. 以上皆對
- (B) 201. 色素結石(pigment stone)形成之主要因素為
- A. 膽鹽(bile salt)在腸肝循環(enterohepatic circulation)減少
 - B. 膽汁中,非結合性膽紅素(unconjugated bilirubin)合成增加
 - C. 膽汁中,膽固醇在超飽和狀態

- D. 膽汁中,游離鈣濃度較高
- E. 磷脂類(phospholipid)在肝內之合成減少

(D) 202. 有關毒物或藥物性肝炎(toxic and drug-induced hepatitis)的敘述,下列何者屬於直接毒性肝炎(direct hepatotoxin),並且形成中心靜脈周圍壞死(centrilobular zonal necrosis)?

- A. Erythromycin estolate
- B. Halothane
- C. Yellow phosphorus poisoning
- D. Carbon tetrachloride
- E. Oral contraceptive

(C) 203. 使用 sucralfate 治療消化性潰瘍,那一項不是其作用機轉?

- A. 吸收膽汁及胃消化綉(pepsin)減少此類攻擊因子對潰瘍之損傷
- B. 形成一黏稠的防護質可對抗酸侵蝕
- C. 抑制胃酸分泌
- D. 刺激分泌前列腺素(prostaglandin)
- E. 可結合 epidermal growth factor 於潰瘍達成修補潰瘍目的

(D) 204. Blumer's sheef 是指胃癌侵犯

- A. 卵巢
- B. 左上鎖骨淋巴結
- C. 脾臟
- D. 直腸週邊
- E. 全胃侵犯,胃壁如同皮革般堅硬之病變

(C) 205. 下列敘述何者正確?

- A. 大腸憩室(colonic diverticulum)出血為年輕人大腸出血之主要原因
- B. 在胃腸息肉症候群中,家族性大腸息肉症候群 (Familial colonic polyposis)及 Peutz-Jeghers 症候群,常有惡性傾向
- C. 對於有 streptococcus bovis 菌血症或心內膜炎者,要特別小心有大腸癌之可能
- D. 大腸息肉症(polyposis coli)之染色體缺陷在第六對之長

臂上(APC 基因)

E.潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis)與克隆氏病(Crohn's disease)之區分,在於前者為節段性(segmental)侵犯,且較易產生 管(fistula)

(B) 206. 下列敘述何者為錯誤?

A.色素膽結石(pigment stones)與膽道感染,慢性溶血疾病及酒精性肝病有關

B.Murphy's 徵象(Murphy's sign)為診斷急性膽管炎(cholangitis)之徵象

C.內視鏡取石術為總膽管結石之治療方式之一

D.總膽管囊腫(choledochal cyst)有產生膽管癌之可能

E.瓷化膽囊(porcelain gallbladder)為鈣鹽沉積在慢性發炎之膽囊壁上,因有產生癌症之可能,故應予以切除